



Alisier blanc

Arbre feuillu

Sorbus aria

Réf. n°188



Essence bocagère et agroforestière · essence ornementale

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Alisier blanc (*Sorbus aria*) — classé parmi les arbres feuillus, atteignant 10-15 m à l'âge adulte, pour une croissance modérée. La floraison a lieu en mai et la fructification de septembre à octobre.

RÉPARTITION

Indigène, calcaire (souvent nommé *Sorbus aria*)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de feuillage	Feuillu caduc
Rusticité	Très rustique (-25°C)
Vigueur	Modérée
Taille adulte	10-15 m
Exposition	Mi-ombre à soleil (toutes expositions)
Sol	Sols drainés, acides à calcaires, pH 5-8,5 ; Sols caillouteux/rocaillieux calcaires, drainés ; hydromorphie : ne tolère pas
Floraison / fructification	Floraison en mai ; fructification de septembre à octobre.
Pollinisation	Entomophile
Mellifère	Mellifère
Résistance à la sécheresse	Bonne
Résistance à la chaleur	Moyenne
Intérêt biodiversité	Bon (fruits pour oiseaux, feuillage argenté)
Mycorhize	Endomycorhize

AMÉNAGEMENT ET GÉNIE ÉCOLOGIQUE

Forêt-jardin

Haie de biodiversité

Haie bocagère haute

Forêt Miyawaki

Aménagement urbain

Arboretum / parcs

Bosquet agricole

USAGES PARTICULIERS

USAGE	ÉVALUATION
ARBRE TÊTARD	Non
ARBRE FOURRAGER	Non
BOIS D'ŒUVRE	Non
ESSENCE RIPICOLE	Non
AUTRE USAGE	-

SENSIBILITÉ AUX MALADIES

Sensibilité élevée : Feu bactérien (*Erwinia amylovora*), rouille grillagée (*Gymnosporangium*), tavelure.

CONSEILS DE PLANTATION

Exposition : Mi-ombre à soleil (toutes expositions). Sol : Sols drainés, acides à calcaires, pH 5-8,5.

FORMAT DE VENTE

Racines nues